

Листок-вкладыш: информация для пациента

Эспумизан®

40 мг, мягкие капсулы

Симетикон

Перед началом приема данного препарата внимательно прочитайте весь листок-вкладыш, поскольку в нем содержится важная для Вас информация.

Данный препарат следует принимать строго в соответствии с указаниями, изложенными в данном листке-вкладыше, или в соответствии с назначениями лечащего врача или работника аптеки.

- Сохраните этот листок-вкладыш. Возможно, Вам потребуется прочесть его снова.
- Если у Вас появились вопросы или Вам нужна дальнейшая информация, обращайтесь к работнику аптеки.
- При появлении каких-либо побочных действий обратитесь к врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше. См. раздел 4.
- Если улучшение не наступило или произошло ухудшение, обратитесь к врачу.

Содержание данного листка-вкладыша:

1. Что представляет собой препарат Эспумизан® и для чего он применяется
2. Что необходимо знать перед приемом препарата Эспумизан®
3. Как принимать препарат Эспумизан®
4. Возможные побочные действия
5. Как хранить препарат Эспумизан®
6. Содержимое упаковки и прочая информация

1 Что представляет собой препарат Эспумизан® и для чего он применяется

В препарате Эспумизан® содержится действующее вещество симетикон, который является средством, устраняющим нарушения со стороны желудочно-кишечного тракта и вспомогательным средством для диагностических исследований. Действующее вещество – симетикон – приводит к распаду пузырьков газа, находящихся в пищевой кашице и в слизи пищеварительного тракта. Высвобождающиеся при этом газы могут затем всасываться стенкой кишки и выводиться под действием перистальтики кишечника.

Область применения

- Для симптоматического лечения при наличии жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, вызываемых повышенным газообразованием, например вздутием живота (метеоризмом) или повышенным скоплением газов, чувством переполнения.
- Для подготовки к проведению диагностических исследований в области брюшной полости, таких, как, например, рентгенография и сонография (УЗИ).

Препарат Эспумизан® применяется для лечения детей старше 6 лет, подростков и взрослых.

Жалобы, обусловленные повышенным газообразованием, могут являться признаком функциональных расстройств со стороны желудочно-кишечного тракта и могут проявляться в виде чувства давления или переполнения, преждевременного чувства сытости, отрыжки, урчания в животе, вздутия живота.

Сообщите лечащему врачу, если Вы не чувствуете себя лучше или чувствуете ухудшение.

2 Что необходимо знать перед приемом препарата Эспумизан®

Не принимайте препарат Эспумизан® в случаях:

Если у Вас имеется аллергия на симетикон, желтый «солнечный закат» FCF (E 110), метилпарагидроксибензоат (МГБ) или на любой другой компонент данного препарата (перечислены в разделе 6).

Предупреждения и меры предосторожности

Перед приемом препарата Эспумизан® проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

При возникновении или длительном характере жалоб со стороны брюшной полости, Вам следует обратиться к врачу. Он сможет установить причину жалоб и наличие возможного заболевания, требующего лечения.

Прием препарата Эспумизан® и других лекарственных препаратов

Данных о взаимодействии с другими лекарственными средствами не имеется.

Беременность и период кормления грудью

В связи с механизмом действия симетикона и незначительностью всасывания из желудочно-кишечного тракта в организм, негативных воздействий, вызванных применением препарата Эспумизан® в ходе беременности и в период кормления грудью, можно не опасаться.

Клинических данных по применению препарата Эспумизан® у беременных не имеется.

Влияние на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов

Препарат Эспумизан® не влияет или оказывает незначительное воздействие на способность к управлению транспортными средствами и обслуживанию механизмов.

3 Как принимать препарат Эспумизан®

Данный препарат следует принимать строго по инструкции, изложенной в данном листке-вкладыше, или в соответствии с предписаниями врача или работника аптеки. Если Вы не уверены, проконсультируйтесь с врачом или работником аптеки.

Дозировка

Рекомендованная доза:

Для лечения при наличии жалоб со стороны желудочно-кишечного тракта, вызываемых повышенным газообразованием, например, вздутием живота (метеоризмом) или повышенным скоплением газов, чувством переполнения:

Возраст	Дозировка	Частота приема
Дети от 6 лет, подростки и взрослые	2 капсулы (соответствует 80 мг симетикона)	От 3 до 4 раз в сутки

Для подготовки к проведению диагностических исследований в области брюшной полости, таких, как, например, рентгенография и сонография (УЗИ):

За сутки до проведения исследования	Утром в день проведения исследования
-------------------------------------	--------------------------------------

2 капсулы 3 раза в сутки (соответствует общей дозе 240 мг симетикона)	2 капсулы (соответствует 80 мг симетикона)
--	---

Применение у детей

Препарат Эспумизан® не рекомендуется применять у детей младше 6 лет и младенцев. В продаже имеются другие лекарственные формы.

Способ применения

Принимайте препарат Эспумизан® во время или после еды, а также, если необходимо, перед отходом ко сну.

Примечание: Можно принимать препарат Эспумизан® также после операций.

Принимайте препарат Эспумизан® до устранения жалоб. При необходимости препарат Эспумизан® можно принимать в течение длительного времени. Прочитайте также раздел 2 «Предостережения и меры предосторожности».

Сообщите своему врачу или работнику аптеки, если Вам кажется, что эффект от лечения препаратом Эспумизан® капсулы слишком сильный или слишком слабый.

Если Вы приняли большее количество препарата Эспумизан®, чем следовало

Отравление при передозировке препарата Эспумизан® практически исключено. Даже большие количества препарата Эспумизан® переносятся без возникновения проблем. Действующее вещество препарата Эспумизан®, симетикон, разрушает пену в желудочно-кишечном тракте чисто физическим путем. При прохождении через кишечник симетикон не всасывается в организм и не подвергается химическим или биологическим превращениям.

Если Вы забыли принять препарат Эспумизан®

Пропущенную дозу можно принимать в любое время.

Если у Вас появились дальнейшие вопросы по использованию продукта, задайте их врачу или работнику аптеки.

4 Возможные побочные действия

До настоящего момента не отмечено никаких побочных действий, связанных с приемом препарата Эспумизан®.

Краситель желтый «солнечный закат» (Е 110) может вызывать аллергические реакции. Метилпарагидроксибензоат (Е 218) может вызывать реакции повышенной чувствительности, в том числе и замедленного действия.

Сообщение о побочных действиях

При появлении каких-либо побочных действий сообщите о них своему врачу или работнику аптеки. Это касается любых возможных побочных действий - в том числе и тех, которые не описаны в данном листке-вкладыше.

Сообщая о побочных действиях, Вы можете помочь собрать больше информации о безопасности данного лекарственного препарата.

5 Как хранить препарат Эспумизан®

Хранить в недоступном для детей месте.

Не используйте данный препарат после истечения срока годности, указанного на блистере или складной картонной коробочке после слов «Годен до:». Срок годности относится к последнему дню указанного месяца.

Хранить данный лекарственный препарат следует при температуре не выше 30°C.

При утилизации препарата следует избегать его попадания в сточные воды и бытовой мусор. По поводу утилизации препарата, который Вам больше не нужен, проконсультируйтесь с работником аптеки. Эти меры способствуют защите окружающей среды.

6 Содержание упаковки и прочая информация

Что содержится в препарате Эспумизан®

Действующим веществом является симетикон.

В одной мягкой капсуле препарата Эспумизан® содержится 40 мг симетикона.

Прочими компонентами являются:

Метилпарагидроксибензоат (МГБ); желатин; глицерин (85%-й); хинолиновый желтый, 70% (E 104); желтый «солнечный закат» FCF, 85% (E 110).

Внешний вид препарата Эспумизан® и содержимое упаковки

Препарат Эспумизан® представляет собой почти круглые, желтые мягкие желатиновые капсулы, имеющие шов и гладкую поверхность. Содержимое капсулы бесцветное и может быть слегка мутным.

Эспумизан® выпускается в упаковках по
25 мягких капсул
50 мягких капсул
100 мягких капсул

В продаже могут находиться упаковки не всех размеров.

Владелец регистрационного удостоверения и производитель

БЕРЛИН-ХЕМИ АГ
(МЕНАРИНИ ГРУПП)
Глиникер Вег 125
12489 Берлин
Германия

Дата последней редакции данного листка-вкладыша: 01.2015.